Diagnose der Schilddrüsenunterfunktion

ZENTRUM DER GESUNDHEIT

Primäre Schilddrüsenunterfunktion

TSH	erhöht
gT4	normal oder niedrig
fT4	normal oder niedrig
fT3	normal oder niedrig

Gleichzeitig liegen Unterfunktionssymptome vor.
Antikörper können nicht gefunden werden.

Schilddrüsenunterfunktion infolge einer Unterfunktion der Hypophyse

TSH	niedrig, aber nicht ganz so niedrig wie bei einer Überfunktion
gT4	niedrig
fT4	niedrig

Gleichzeitig liegen Unterfunktionssymptome vor.
Antikörper können nicht gefunden werden.

Schilddrüsenunterfunktion aufgrund eines T3-Überschusses

TSH	normal
gT4	normal
fT4	normal (im oberen Normbereich) bis erhöht
fT3	normal (im oberen Normbereich) bis erhöht

Gleichzeitig liegen Unterfunktionssymptome vor.
Antikörper können nicht gefunden werden.

Schilddrüsenunterfunktion aufgrund eines T3-Mangels

TSH	normal
gT4	normal
fT4	niedrig
fT3	niedrig

Gleichzeitig liegen Unterfunktionssymptome vor.
Antikörper können nicht gefunden werden.

Schilddrüsenunterfunktion aufgrund einer Schilddrüsenhormonresistenz

TSH	normal
gT4	normal
fT4	normal
fT3	normal

Gleichzeitig liegen Unterfunktionssymptome vor.
Antikörper können nicht gefunden werden.